Cardiale medicatie

Dr Selleslagh

Nov 2014

DEHARTKLINIEK
PREVENTIE DIAGNOSE & PERSOONLIJKE OPVOLGING

Anti arritmica

- Cordarone
- Tambocor/Apocard (niet bij hartfalen)
- Sotalex, b-blokkade, digitalis

Gebruik bij VKF, VT, SVT

B-blokkers

- Bisoprolol: Emconcor
- Carvedilol: Kredex
- Metoprolol: Seloken
- Nebivolol: Nobiten
- Propanolol: Inderal
- Sotalol: Sotalex (anti arritmicum)

Gebruik bij: arritmie, hypertensie, hartfalen, ischaemie

Bloedverdunners

Aspirine

OACS: Sintrom/Marcoumar

NOAC's: pradaxa, xarelto, eliquis, lixiana

➔ . Niet valvulaire VKF
. Profylaxie knie heup
. DVT
➔ . Voordeel: geen INR controle, minder bloedingen
. Nadeel: Geen antidotum
. Gebruik juiste dosis!!, dagelijks in te nemen!!

Ca antagonisten

- Amlodipine
- Isoptine
- Tildiem
- Vasexten
- Zanidip

Gebruik bij hypertensie, SVT

Cholesterolverlagers

- Lipitor
- Crestor
- Zocor
- Ezetrol
- Inegy (simva en ezetrol)

- Lipanthyl (metabool syndroom, intolerantie statines)

Diuretica

- Zwakke: Hydrochloorthiazide: CO
- Sterke: Lisdiuretica: lasix/Burinex
- K spaarders: Aldactone

Nitraten

- Corvaton
- Cedocard
- Deponit/Minitran
- Coruno

Plaatjesremmers

- Aspirine
- Clopidogrel: Plavix (NSTEMI met CVA in VG)
- Prasugrel: Efient (Infarct, diabetes)
- Ticagrilor: Brilique (NSTEMI)

RAS remmers

- AII blokker=Sartanen: Atacand, Aprovel, Cozaar, Olmetec, Diovane

- ACE i: Capoten, Renitec, Zestril, Coversyl.

→ ACEi: hartfalen, hypertensie,
→ Sartanen: hypertensie, en intolerantie ACEi

Acuut coronair syndroom

Belangrijkste wijzigingen:

- Het begrip ‘acuut coronair syndroom’ (ACS) omvat zowel het acute myocardinfarct (AMI) als instabiele angina pectoris (IAP) met klachten in rust.
- De indicatie tot prehospitale trombolyse, met bijvoorbeeld alteplase, reteplase of tenecteplase, is vervallen.
- Zuurstof wordt, indien beschikbaar, gegeven bij respiratoir falen (dyspneu in rust en/of centrale cyanose, grauw zien), en niet meer routinematig.

Angor

- B-blokker (selectieve b1 of kredex)
- Bloedverdunners (arixtra, fraxi)
- Ca antagonisten
- Nitraten (corvaton IV)
- Plaatjesremmers (plavix, brilique, aspirine)

Infarct

- B-blokker
- Bloedverdunners
- Plaatjesremmers
- **ACE inhibitoren (remodellling)**
- Cholesterolverlagers

STEMI

NSTEMI

- Klinische presentatie is gelijk
- Bij STEMI: ST elevatie
- In beiden is er trops stijging.
- Geen Trops=instabiel coronair syndroom
- STEMI: Brilique, efient
- NSTEMI: Brilique
- Instabiel CS: Plavix.

Hartfalen

- B-blokkers (kredex, emoncor)… procoralan
- ACE inhibitoren (Zestril, Coversyl)
- Ca antagonisten (bij hypertensie)
- Digoxine (bij VKF)
- Diuretica (lasix, burinex)
- Nitraten (corvaton)

Ritmestoornissen

- Anti arritmica (cordarone, apocard)
- B-blokkers
- Bloedverdunners (antico of NOAC)
- Ca antagonisten (isoptine, tildiem)
- Digoxine
- Plaatjesremmers (ischaemie)

Hypertensie

- Ace inhibitoren: Coversyl, Zestril
- Sartanen: Diovane, Aprovel, Belsar
- b-blokkers: Nobiten, biso, kredex
- Ca antagonisten: Amlo, Vasexten, Zanidip
- Diuretica: Co of plus in combinatie
- Centraal werkende: Moxonidine, catapressan

- Combinatiepreparaten: co of plus /forzaten, Sevikar/ Coveram

Hypercholesterolaemie

- Statines (ischaemisch hartlijden)
- Lipanthyl(metabool syndroom)
- Omega 3 (visolie)
- Ezetrol (opname chol in darm; in combinatie met statine)